解圍元藪

解圍元藪卷一

明沈之問先生編輯　梁溪黃鐘樂亭甫校訂

六經三十六瘋總論

若夫嵐瘴蒸襲。日月霾光。

嵐瘴。乃山川鬱薄流灑之氣。天道乖違。則彌漫充塞於六合之內。則日月蔽其光彩。如患癘風之人。濕熱邪毒之氣蒸襲。或服熱毒之藥。久則眼目昏瞶。翳障注爛。自然失明也。

龍虎驕騰。波瀾泛湧。

雲從龍風從虎乃陰陽物理之道若龍虎失職暴儆逞威則風雲倏陡雷電交掣淫雨滂沱颸颶噓吼其波濤湧躍泛濫狂越矣如風癘之人不惜身命冒犯賊邪則氣血由之而蕩敗惡證由此而變更大病既成將何救治

火炎崑崗兮英華凋落

火焰崑崗則玉石俱成灰燼矣煙炱狂迸草木豈能抵受枝葉焦墜根本傷殘如風病之人邪火內盛則毛髮鬚眉焦燥敗毹髓液乾枯面貌不榮肌

膚黃痒不澤矣。

神離元牝兮。空谷傳聲。

老子云、谷神不死。是爲元牝。又云、元牝之根。衆妙之門。人之泥丸丹田。元神守之。如元神不守。則精氣離散。病將生焉。神旣不守於宮。精神渙亂。元氣無依矣。則聲何從而響應。神氣之音元神有虧。槖籥關節危敗。則音聲變異矣。如風病之人。邪火燄盛。致使精神散亂。氣血敗亡。槖籥會厭無從毋養。則語言錯襍。音啞呆噤之病。變更健忘顚倒也。

蟲蠹花心而不實。

草木果菓之實由花以結成花之精靈乃心上之簇粉也若花之粉箱有損則不結實矣如花發時被蜂蝶之蠹殘蝕其心則不成實總結亦難肥大由此知人之元神在於精氣元神全以腎水所鍾若風病之人不惜身命恣貪色慾敗損精液如花之損心則性命不能延永。

鷹餓鷨（音花）蔵而爛腸。

鷹食諸禽之肉以養生不食草木之類宋王養一

鷹甚愛之。意其食肉則肥健。日令庖人剮百鳥之肉。剁成團而喂之。恣其過飽。肉內又以椒辣之味和之。使其香而美也。鷹食過甚。不久腸臟腐臭而死。如風病之人。宜節飮食。澹滋味。菜蔬調養。若不謹戒而饞食肥甘香辛美味。猶鷹食麪餅。非惟不能養生。豈得苟延殘命。

色如隨錦流霞。邪充五內。

渾身遍發斑駁紅腫。赤色黑色五色之紋者。乃寒濕風邪毒氣。流注充滿於五臟。泮渙於脈絡百骸。

病勢已劇。內形於外矣。形似薰煤磊石。血溢六經。人賴氣血周流充潤。故肌膚滑澤。容貌光華、若面色如烟薰昏暗。或似煤炱黴黑。或塊壘高低。纍敗灰塵之比。則氣血不守。內涸枯焦、元氣泛傷於外。精神敗壞。離脫榮衛。大病已劇。若不速救。則夭折之患立至矣。風病之質。不過痛癢麻爛億脹六種也。

古云頭面起者曰順風。腰足起者曰逆風。上部先見

上必盛下部先見下必多

人身。十四經枝絡。絲系皆環於巔頂。交於百會。氣血周流。旦夕不息。五臟之竅。皆達於面。故面乃諸陽之會。獨能耐寒。諸氣相逼。故臟腑受病。先見於頭面。氣血皆向上。領毒上出也、若於腰胯之間先發者。則氣血凝毒。搏滯關格。上下不舒。腿股厚實之處。不能藏蓄。若先見病。則氣血引毒垂下。而日益深沉。藥力難至。不易驅伐。經云、身半已上。同天之陽。身半已下。同地之陰。從上發者。陽中之陽。氣

從上出而爲順。攻之易散。氣反下行爲逆。伐之難於奏効。上部先病。邪聚於上。下部先發。邪併於下。丹溪云、氣受之則上多。血受之則下多。蓋氣之性冲上。血之性流下也。故上多病者。氣必虛。下多病者血必竭。風本屬陽。癘本屬陰。故癘瘡於下部先見易治。在頭面起者必凶。又有遺毒之患。陽明胃與大腸。無物不受。日百納之倉廩。風毒之氣。皆蓄於此而發。如布囊盛物。一有穿孔。皆從而泄之。風在人身亦然。如有穿爛者。則不能速斂。毒氣漸出

也。

瀉痰去濕。利氣清陽。針委中。刺腫塊。耗泄毒血。治要之捷。萬類千方不過如此。

臁濕中人。虛火隨起。痰因火動。氣滯不清。腫處則毒凝聚。針之使散。且如有治紫雲腫塊者。以小艾炷灸之。火氣透入皮膚。拜引邪入走出也。委中穴。在兩足對膝後膕中央曲脉兩筋中。即血郄穴也。三稜針出血。妙。八風八邪穴。在手足指趾本節背後交叉中虎口內直針入三分。瀉多不入經絡與

膀胱經之委中同治癘風麻痺不仁攣曲無力之症。

嗇蛸附輕粉砒霜。切忌不可妄投。參芪白朮芎歸。尚且宜擇而用。祛風瀉火。殺蟲排毒爲先。補血壯元。滇滯堅筋相濟。血足風自消。氣清風自散。是聖賢確論。萬古之下。豈能改乎。

世有妄醫。用八將追魂方。內有砒霜與土狗蜈蚣等件。又有一等粗人。妄用烏梢赤蟮等蛇煅灰。暗投藥中與病人服。乃云以毒攻毒。其害甚大。古有

醉仙散以輕粉爲主。服之或一時苟愈。必使毒留臟腑。百節鑄痛。至死不已。又使腫塊痿頓。蓋毒犯心經。則肘膝腫大潰爛。筋節脫落。毒犯肝經。則眉髮髭落。皮色放光不澤。毒犯脾經。則貪嗜饞食。音啞。眼皮坍垂失明。肉堅塊瘰。口喎頭暈疼痛。毒犯肺經。則痰涌喉痺。鼻毀臭爛。手足攣曲。毒犯腎經。則腰跛膝躄。骨節痠痛。腦裂陰莖爛落。毒犯胃經。則渾身疙瘩。膿穢腐臭。癱瘓脹滿。或脾泄瀉痢。腹痛。終身爲害。風癘之人。其熱必盛。故血液乾燥。皮毛

枯脫若又加附子川烏等熱藥。猶抱薪救火。人之眼毛扇掃塵埃。使不入目。故常閃霎眴動。若燥熱秏落。則塵埃無所袪。掃飛入目中。必常揩拭。漸致眼紅坍爛而成大害。且虛火暴虐。則眞水必衰。若又以烏附謬言補陽。豈不助火邪而燥其陰。腎水乾涸。慾火熾盛。以速其死。又謬云用蛇蝎等藥以毒攻毒。欲刼病於一時。以誘財利。不知癩風由毒積成。又遇毒藥。以火濟火。如寇遇夥類。聚混淆。反助賊邪。鑽透骨髓。蠹戕元命。豈可用乎。蓋風病血

虛。卽陰虛。庸醫疑以大補爲主。用人參黃芪。不知黃芪乃補氣之劑。服之反助陽邪而耗陰血。經云血虛服氣藥。則血愈虧。病必日增。過多則死。如水在溝瀆。風捲必涸。故血虛忌用氣藥。人參益氣生津。和中。病後僅可服之。又助太陰之火。故肺熱者宜忌。况多服必有參毒。發喘湧痰。總不如玄參攝血歸元。祛五臟之游火。爲風科之要濟。白术調脾去濕。川芎爲血中之氣藥。行血滯於氣分。當歸爲血中之主藥。活血各歸於其經。始治必用之爲綱

。領古云醫風須補血。血足風自滅。又云醫風須理氣。氣清風自去。極有旨趣。壯元可不瘦。堅筋可不攣。豁痰則氣自清。降火則血可養。此治風之要也。須戒嗜欲。絕女色。禁食一切動風傷血敗氣腥鮮辛甘瓜果粉麪。方可延生。否則雖愈必發。

風病之人。不忌毒食。乃加重之端。不戒女色。實速死之兆。故丹溪言治五人。止一貧婦淡薄。且寡得永天年。禁戒之專也。餘皆不免再發。不守禁戒之咎也。孫眞人治四五十人。終無一人免於再發。非

真人不能治盡無專心守戒者也。其猪肉羊肉動氣發風。牛肉驢肉沉疴頓起。燒酒動火。麯酒動濕。肥甘美味皆宜忌之。惟烏魚功並蚺蛇蟃蜊殺蟲最勝。烏鴨凉血補元。食之又助藥力。凡椒芥葱蒜姜茄大能發病。猶當絕之。若不嚴戒。雖愈必尋毒而生疥癩蝕癬之類。漸滋舉發。爲喪命之機。

藥病總說

三十六種風症。不過痛癢麻爛腫僵之類。一百八道方藥皆排毒殺蟲補血壯元理氣之劑。諸賢秘論各

醫門獨自古聖賢遇病立方議論參詳各據一理癘
風多種所由不一且如北人剛勇而地高燥南人風
氣柔弱而地卑濕潮濕多有嵐瘴蟲毒之氣江淮常
受汝水寒冰之傷海島風濤山谿林麓貽害無窮丹
溪專攻外感理氣清陽利於南方東垣專理內傷導
痰去濕利於北方孫眞人王好古許旌陽抱朴子等
或以殺蟲排毒或專補血壯元或惟調氣清神各有
大意而制方無不驗然諸家各有秘旨後人若能辨
症用之自有効驗須博覽各家之術約而擬之定合

符節如得一方便誇能治必無皆驗之理且如五龍丸有斬關奪帥之功千年藥有起死回生之妙癱爛敗絕者非東華玉髓不能復其原斑爛舛錯者捨馮夷瓊漿烏能掃其跡若合其宜如弩發機若違妄用如水澆石

黃龍丸即水煮黃香丸能治三十六種大風危症

烏龍丸治風症內熱痰火上攻并周身痒癩燥癢作痛白龍丸又名捕龍丸治上半身痛風極凶者

花龍丸又名渾元丹治腰半以下腿膝大痛者赤

龍丸即一粒金丹治痛風遍身抽掣日夜叫號者。千年藥乃祖師邋遢張眞人遺下平分家產方。又曰靈寶千年大藥治三十六種大風十四般大癘。無所不効東華玉髓乃大風子油膏治爛風瘡穢者。馮夷瓊漿又名推雲酒治五色疙瘩雲顏麻木者。若對症用之無不奏效若亂投妄用則不見功。必須脉藥相配診視相叅對症施治隨手獲功執方膠固彌柔何靈。

凡有一般症候自有一般脉色辨診不同古有形

診聲診色診脉診之條。欲觀其形貌而診驗吉凶。如頭爲清明之府。若傾視則神將奪矣。背爲胸臆之府。若胸曲肩垂則氣將壞矣。腰爲腎之府。若轉搖不能。則神將竭矣。骨爲髓之府。若不能久立行動振掉。則骨將敗矣。筋爲血之帥。若攣曲不舒。則血將枯矣。此爲望形之診也。欲聽其音聲而診驗吉凶。如語先輕後重高厲有力。則外感有餘也。若語先重後輕沉困無力。內傷不足也。此爲聞聲之診也。欲觀其色而診吉凶。如青者欲如蒼璧不欲

如藍。如翠羽者生。如草滋者死。黃者欲如羅裹雄黃。不欲如黃土。如蟹腹者生。如只實者死。赤者欲如綿裹硃砂。不欲如赭。如雞冠者生。如衃血者死。白者欲如鵞羽。不欲如鹽。如豕膏者生。如枯骨者死。黑者欲如重漆。不欲如地蒼。如烏羽者生。如煤炱者死。此為觀色之診也。脉經云。癥脉陽浮弦上關也。陰實大。也關下兩寸浮而緊或浮而洪。浮緩者易治。洪大而數。或沉實者難治。脉若沉者病反在上。浮者病反在下。皆不治。此為切脉至而診吉凶也。

故曰陰陽配偶方脈叅詳此理通徹則藥對症何憂治而不愈哉若執一死方以治諸症非惟無益反害于人。

然導痰祛濕如蒼术、白术、南星、半夏、貝母、皂莢、茯苓、阿膠、厚朴、玄明粉、瓜蔞仁、胡黃連、青蒙石、銀柴胡之類。

濕而膩服痰結者。非厚朴不消。玄明粉止可爲丸服。不宜入湯液。濕痰成塊者。阿膠專主。爲末服之。若水煎服。則臭而無功。皂莢打痰。從大孔出甚速。

銀柴胡治肺熱之神藥。癘風聲濁爽臭者必用之。止入丸散不入湯液。若骨蒸寒熱者。一見胡黃連卽愈。亦不入煎劑。煎則無功矣。

利氣淸陽。如沉檀、射腦、乳沒、木香、縮砂、豆蔻、益智、遠志、升麻、犀角、珍珠、丹砂、牛黃、柴胡之類。

氣閉則陽微。氣結則血匿。諸香皆能開導幽微隱僻之鬱。通達關竅。氣滯非提不起。必須升麻柴胡之屬。牛黃珠粉等件。香劑能消氣聚之塊。止宜丸散。不入湯液者。以火炒水煎。則味愈著。令人嘔吐

噦啘」況有諸香不宜見火之說。
祛風散邪。如羌活、麻黃、荊芥、紫萍、苦參、風藤之類。
病以風名。皆由風濕寒暑之感。若不發散邪氣。何能消溶。羌活之類。皆不可缺。苦參最殺風癘之蟲。瘡癬皮內之蟲立死。服之五臟蟯蟲立去。方中必用之聖藥也。
補血生液。如當歸、玄參、紅花、茜草根、紫草、血竭、鹿茸、夏枯草、桑螵蛸、原蚕蛾、生地黃之類。
玄參去五臟之游火。并血歸元。紅花去死血生新

血。爲治風必用。戴元禮云夏枯草爲血虛所宜。桑螵蛸之補陽塡精比于人參有霄壤之功。晚蚕蛾有再生精髓之捷。血竭乃去積瘀血作痛之卒徒。故多用之。

蕩滌積滯。如代赭、皂莢、雷丸、蜂蜜、人牙、千金子、人中黃之類。

油膩脂膠之積。緻腸胃。非皂莢不去。代赭石名血師。專排血積瘀凝。善活血不使攣曲。雷丸去積殺蟲。止可用于男子。婦人服之。必脹悶腹痛。發昏甚

則顛呆痰涎湧塞。故男子用雷丸。婦人用皂莢。刼殺蟯蟲如錫灰、黃芽、雄黃、鶴虱、槀實、鷰翎灰之類。黃芽糞中蛆也。于四月內未食茄子之前收者方好。以澱茶滷養滷炙香方無油泛。專袪蟲積。鷰翎灰最殺風瘡中蝕蟲。若皮內瘙疥蟲。非此不除。麻痺癱瘓。如菖蒲、天麻、萆薢、防己、秦艽、豨薟、胡麻、香蛇、漏蘆、石斛、蒼耳草、白蒺藜之類。血枯必痛。血凝必麻。須用補血逐血之劑。故萆薢之補陽。菖蒲之升陽。豨薟草乃風病元氣虧乏之

聖藥。非止癱瘓者用之。

筋攣跛軟。如苡仁、牛膝、杜仲、續斷、狗脊、萎蕤、白花蛇、

仙靈脾之類。

風注四肢。非萎蕤不能上下左右蒐逐。又能消爍

諸般毒物。陽痿筋攣。非仙靈脾不能興起。乃大補

元陽之藥。實救本之妙藥也。

愛食瓜果者。須倍射香。躭嗜麴蘖者。必求枳椇。曾服

汞粉。定用鉛磁。若進毒藥。急行和解。參芪之性不及

升柴。此特大畧。博而約之。

治風之法。先散寒邪。次攻蟲毒。次調元氣。次養陰血。待風散蟲死。血足氣清之候。再拔瘡穢。舒其筋而伸其攣。滋生毛髮。則病愈不發。補益之藥。終身服之不可止。乃不刊之秘論也。若欲速不分次序。則隨得隨失。變駁反掌。非惟無益。必反害之。如升麻能使濁氣從右而上散。柴胡能令清氣從左而上達。參芪惟能助氣。而反附陽邪以損陰血。風癩以養血清陽爲要。故參芪不及升柴之提散洞達經絡開導肌表也。射香能消諸瓜果之毒。發渴者。

乃瓜果之積用之卽消枳椇卽金鈎樹子能祛酒毒好酒之人宜服之黑鉛磁石花椒專收輕粉水銀之毒恐庸醫瞎投故宜服之以免發毒此用藥之大畧也

近世專用大風子爲良方不知此藥性猛大熱有燥痰刼血之迅力製煉不精則病未愈而先失明矣

大風子卽海松子又名丟子因其專能治風而名也生於東海日出燥炎之地故性大熱能直入肌骨殺蟲祛濕夷人稱爲丟子當果食之以治百病

蓋海島之俗食生物者。腹多蟯蟲之毒。服此以蕩滌之。如閩廣人食梹榔以禦風瘴也。其肉上白膜最能損目。其汁最能敗血。如生食之。傷人臟腑。其性怕鹽。見鹽物卽消之。無用。故服此者必忌鹽醬。若得麻腐與之同服。則功愈。滌須專門用之。製度有法。則功勝於諸藥。若無傳授。而道聽妄用。非惟無功。反生他害。丹溪云。大風子有燥熱之毒。能敗血動痰。損人之目。信不誣矣。且據富翁陳善長患風年久。求子先君治之。先君思善長躭於酒色。日

不問斷必難治。固辭不藥。善長密賄予家老奴盜傳製大風子之法。善長依法製度三年共食大風子肉七十餘斤。其病脫去絕無他患。一日持禮幣至予家。謁先君曰。昔年求治力辭。何也。先君甚赧顏厚謝老奴而去。始知盜方之弊。想風病損目。難歸咎於大風子。蓋世之不食大風子而瞽者甚多。後人不可泥於紙上之語。

始以湯藥宣暢。次以膏酒灌融。丸散調護。王道之常。

風癩之藥煎劑奇方。最能速效。逐散風邪。通暢脈

絡無留毒之患第恐蕩敗脾胃故不宜久服一見病勢稍緩即進丸散以厚脾胃其希莶苦參蒼耳八寶歸朮丁公藤等膏提於却病補養但恐傳授無脩煉之法其藥酒雖人喜服切不可施於初病之時且風疾初起病尚點滴塊瘰未曾散漫若即用藥酒追排氣血領毒遍透脉絡則遍身皆病難治矣須待病愈之後防其再發宜服藥酒使藥力鑽透肢體把截毫竅基固神堅邪毒不能再犯也其腦射牛黃金石香料不入湯液又忌見火惟和

丸散服之功力合宜而順。故治風者。先須湯液。次用丸膏。愈後方進藥酒。為治法之序。

世有妄徒盜習火刼蒸燒之術。愚人爭赴。戕害深可痛也。夫風病根於臟腑。既發於外。其勢已減。何又煅逼使毒氣復入。假火為禍。暫雖少爽。禍不旋踵。

風癩之病。穢積蟲毒。先傷臟腑。延注筋骨。譬如寇入。驅出即禍減。追之為上。何故又加蒸熨刼之。復令毒氣回伏膚腠。潛入肌脈。假火薄之。勢流毒既開之孔竅。仍傷臟腑耶。且人身毫髮孔竅。一見火

氣百孔皆開。何氣不入。舊邪未息。新邪又入。初則毒氣禦火暫離肌表。必然皮毛顏色頓改。骨節痠折。疑是愈而爽快。愚人喜以爲美。非吉兆也。乃新舊邪毒入鑽之故。爲加病之漸耳。夫病人血氣已弱。再犯火毒。則氣愈敗。血更衰。津枯骨燥。若至七七日外。火燄濕熱之氣在內。尋注經絡。充塞臟腑。必使皮肉堅硬而痠痛。瘦弱無力。精乏目暗。肢軟足蹩步澁。再不避風寒。戒酒色。必至腐爛失明矣。宜速解救。以免大害。且風蟲因內熱而生。復得火

濕愈加滋蔓仍傷髓液至一百二十日後其火鬱濕熱之氣流遍周身病勢反凶於舊急宜用解藥掃拔禍根多有氣血衰弱者隨蒸而斃人猶不畏何哉若未曾服藥便用蒸熨則驅毒氣深入骨髓消蕩血液若已服藥既攻毒氣欲散烏可復遏鬱聚初治行之使毒氣勝于正氣禍不旋踵後治行之使毒氣入於新元禍仍僭亂急則急危緩則緩害戒之戒之故丹溪云必先殺其蟲瀉其火然後生益凉血祛風遏滯降陽升陰雖治法頗多大都

不外乎此。夫丹溪尚如此。後人何可用蒸燒之刼而害理殃人乎。

熱刺鋒鎌。慘楚何益。針灸薰洗。緩泄還宜。

凡風癘所起之處。每難全愈。欲其全愈。必追毒併歸於此。然後以藥點之。使爛而方迹熄根滅也。若病未愈。不可周身塗點。其點藥之性熱。過於火毒過於煬。若點遍身。則熱毒圍攻。焉能當之。又每有妄徒以針刺破皮。內用醋墨塗之。使爛。妄言攔阻病勢。不知病根鑄於腸胃。年深發見於肌表。先從

髓液透出、豈可於皮外刺爛而能阻之乎。空受痛苦。而結痂痕疙瘩。使形醜貌陋。其病反加。未見毫釐效驗。其或濕痒瘙麻腫塊。皮肉脹大。血死漬貫者。可以鋒鐮敗泄。如紫雲白癜血癬等症。可以小艾炷團團灸之。使艾火引毒漸泄。雖疼痛一時。亦能提散毒氣。若乾風痺燥之症。氣血尚且不足。烏可又行鋒刺。愈加耗竭。肌膚之間。全憑血液轉使。筋枯力乏。手足不能運用。其皮膚麻痺者、乃血液虧損之故。內頻服藥。外頻熏洗。內外應合。引其經

絡之間新血充足氣脉漸漸榮活而愈矣切不可驟用黙刺鋒鎌暴虐慘酷剝害膚體況風癩非一時可愈者總不如令其服藥緩緩奏功為上且風癩之人氣血必衰治風癩之藥無非克伐迅劑治之將半即宜用補劑扶其根本不可伐盡氣血致津液乾枯形神憔悴而損遐齡用藥尚然豈可妄下針鎌霸道之毒手以速其死乎

癩症一十四種六府所屬

大風症名考究諸書悉無遺失病源云風癩一症

輕重之別耳。其害則一也。癩愈形猶可復。風愈元氣難全。癩死者少。風死者多。大都皆非善症。轍跡一類。

曰火曰蟋蟀、心之癩也、

火癩

此症初起如火灼之瘡。大小不一。或如癬皮裂。斷肢趾。愈又復發。由心臟受毒七年。病根方盛。眉睫落。大勢成。手足瘻。又有一種遍身點滴。紅紫生於皮膚之上。形似瘢痕之狀。不過十數日漸自散去。或五六日

亦自散後結心毒生瘡不能速愈亦能傳注於人

蟋蟀癩

此症乃火癩之後餘毒內結變成形如蟋蟀蟲紋內泛鑽鬱百節諸竅皆欲出血額爛鼻朽口唇毀斷齒牙脫落癱瘓難動或時驚跳戰兢多懼或眼赤爛泪痰乃心火燄烈也

曰木曰風肝之癩也

木癩

此症初起如蟲癬之狀大小不一其色赤白不一或

連錢高低不定。俗稱棉花瘡。久則連片腐爛。腥穢。眉睫落。面目痒。愈而又作。或去或來。無時定息。三年始成大害。肝敗難治。又有一種如棉花之核。其粒高起硬痞者。火變成蝕癬不愈。

風癩

此症乃木癩之後。毒薷肝經。則四肢骨節。筋骱攣痛。甚者。叫嗅不能轉側。皮毛枯槁。肘膝大小。狀如鶴膝。白虎風。腐穢癱瘓。聲變形異。或結於肠肋腹肚上。爛至腸胃。或爛去耳瞄。皆癩之毒也。

曰土曰蛔脾之癩也。

土癩

此症初生塊瘰。先發潮熱。或嘔吐。或黃腫。大如雞卵。小如彈丸。或如麻豆。穿即成瘡。膿滋腥穢。由脾受賊邪。炙煿毒味。禽獸魚鱉。久而成之。急治則可。若至六年。病成禍速。入聞其氣息。即染成病。遺害甚大。

蛔癩

此症乃土癩之毒。潛注脾臟。流於四肢。則垂重難舉。手足肘膝。腐爛膿血。臭穢。或指趾毀落。腫大如車軸。

癱瘓注爛直見筋骨。痛憊而死。或發於胸膺肋背。先腫如痞後又穿爛。日久。叫號刺痛而死。曰金曰麵曰白、肺之癩也、

金癩

此症初發如楊梅之狀。上無蓋殼。內泛碎突出。紫赤色爛花凸起。儼若楊梅。由毒入肺經。不久眉睫毹落。三年鼻柱崩倒。眼翻唇斷。此乃天付之咎。陰空神祟之禍。定有遺毒。久治方可挽回天意。不比他種可以速愈。

麩癩

此症乃金癩既愈。餘毒難消。盡存肺臟。致生如麩細蟲。舉體艾白斑駁。周身或如癱癬。皺如泥壁風狀。惟外加熏洗。則能取效。

白癩

此症乃寒暑濕熱之氣。邪毒醸襲。瀰漫肺竅。積生惡蟲。蠹嚙肺管。使聲破目瘖。肢體頑痺。骨骱中如火燃。心胃燥熱。手足背脊拘緊。肉如刻劈。以致身體手足瘡瘍。鼻生息肉。氣塞不通。濁涕流涎。山根高腫。腦門

時痛或目生白翳無光多爲鼻瘫外不發瘡人皆不識此癩故治之無效曰水曰雨曰烏臀之癩也

水癩

此症必先得水病因而停留又爲風濕觸激或生陰莖疳蝕或陰囊兩傍發起腫塊長科腿腰形似橫痃寒熱交作脹痛難舉上下漸大如潰即變成瘡遍身腐爛一年眉髮落病劇難治

雨癩

此症乃水癩愈後餘毒在腎以致生蟲其毒泛注周身生五色斑點乖癩眉鬚秏落陰莖痿爛或陰囊破損或陰莖蛀幹皮肉流膿漸漸爛去輕則爲下疳魚腮等瘡久則唇鼻耳瞎皆爛毀腐腥臭與廣瘡症同

烏癩

此症乃邪毒入腎變生惡蟲飡嚙精髓下虛無救若胃脇肋腿臀股間生如李柰桃梅狀顆塊軟泡穿爛腐臭難治或如漏瘡或癮瘮赤黑手足頑痺針刺不知或脚不能蹈地或飲食時則開口而鳴或兩肘如

纏縛或穿處則腐爛流膿粘着即生腐瘡或皮肉活
癢怕見風濕或平時骨間淅淅瘦响皆當大補氣血
為主

曰酒曰麻胃之癩也

酒癩

此症因酒色之時汗出體虛迎風入于胃腑遍身生
瘡大者如錢小者如豆不赤不白灰黃變形膿屭粘
堆或有不飲酒之人素受寒濕風邪微見酒氣汗出
迎風亦然或有好罔性急燥暴色慾過度之人多犯

此症久則眉髮脫落令人惶懼難治

麻癩

此症由酒癩之後毒留胃腑遍生毒瘡如癬疥淫癢難忍或手足掌背頑痺不仁黑白不等形如雁來鵞掌風之狀或如牛皮血癬時痛時麻蟲蝕脾胃或發肉痣頭硬而碎形如蟮木遍身皆然人呼散頭木觸之則大痛冷汗一二時而息

癘症總論

夫治癘之方與風少異丸散點擦各有秘傳切忌熏

鎌輕粉

凡患風癩。決非一種。或二三種者有之。甚至有四五種者。先傷一臟。則注各經。故年久者形色變駁。病勢愈甚。且如風病先染冷麻而變紫雲黑色者。有之先染痛風。而成半肢軟癱者有之。先染火癩。腫大穿爛。手足廢弛。筋骨痛瘦者有之。故治難以一定。方藥不能驟攻。愈一症而他症變駁。反見其勢凶也。又有風癩同患一人者。若先染風病。後患癩症。曰風癩。先患癩病。致成風病者。曰癩風。此等

最多。癩風則先治其癩。癩愈方治其風。風癩則用治風之藥。後加治癩之劑。此是大意。治至半愈。即服解毒大補氣血元陽之劑。勇進三年方可。經云、逐五臟之邪。鬼。開門方死。瀉膀胱之濁穢。淨府始潔。倒陽絕慾。勉強矯揉。內養靜脩。仙機妙運。魂魄屍神之竅曰鬼門。掃蕩臟腑之穢惡。則清氣得以升降運育。自然形容潤澤。若穢濁之滓沉滯下元。則九竅不清。十四經壅塞。祛滌其穢。則源清流遠。陽氣舒暢。而精神爽快。上下清明矣。故制烏

龍丸之劑。一進以靖內汗之濁。風癩之人。五火俱盛。陽事易舉。若不愛命而近女色。則服藥斷無功效。欲其不舉。不得已以藥倒之。病雖可愈。又恐斷人生育之根。陰陽相關。若巳有子者。則全其現在之命。絕其喪命之端。未爲不可。若未有子嗣。則宗祀爲大。切不可行之。然倒陽之秘。有用藥者。有用功者。妙在心傳。此理非庸人可知。若病人聰達。授以元門內事。靜脩導引之功。使內固丹基。外安神役。再進藥力併攻。則其壽無疆。此方得英敏之士

方可行之。若愚妄利徒。非惟不能盡術。反使冒賣聖賢。再針灸之法。前後無忌。點藥止可用於愈後除根。壘刺之端。始終不可用。若鋒鐮一有不當。則刀口引風。入內令人殘廢。枯敗。戒之戒之

吁。醫司民命。藥有良毒。不讀方書。憒然無據。死生關係。陰隲非輕。患風癩者。當保惜天賦。毋從愛憎毀譽之口。自宜揀擇醫之良拙。治風癩者。當敬畏天譴。毋貪欺詐苟且之財。害人之命。

人患風癩。命懸旦夕。求醫調治。死生攸關。務得高

明仁厚之人方可倚托往往見人不擇醫工之精粗但見其自逞矜誇不讀方書盜襲死方欺罔奸佞惟貪輕信或倩人薦拔粧點巧譽之言卽從而治之豈不殺人乎且風癩之科一症有一方其人止學得一二方豈能悉治諸症如紫雲之藥不能治爛風痛風之藥不能治癱麻漏蹄之方若治癱攣則反爲害庸俗何知之病者旣欲延生而求醫若不揀選實輕命也痛哉惜哉夫癩風乃十三科之首此論亦十三科中妙訣反覆精詳不爲不備

後之君子得之則瞭然無所窒碍矣。

夫城池受困於寇。即如人身受蠱於風癩。形質一也。以兵攻賊。如以藥攻病。籌猷一也。寇不退則城池崩陷。風不消則元命傷殘。患害一也。欲救城池必運神機。欲救人命。必行妙術。妙用一也。所論風癩之理。皆明此書。所治風癩之藥。皆備此書。更無遺隙矣。用藥如用兵。保獲如救命。療人之病。以復元命。解城之圍。以活蒼生。輕重之殊。實元之妙法。深淵之大澤也。故曰解圍元藪云。

解圓元藪二卷終

解圍元藪卷三

方藥目次上

方藥目次下

解圍元藪卷三

明沈之問先生輯　錫山黃　鍾樂亭氏校訂

六經湯先秘方

心風　先傳肺經外證損目

煎方一

防風　細辛　南星　白茯苓　薄荷　大茴香

桔梗　山梔各二兩　當歸　首烏　羌活　牛膝

牙皂　蟬殼　枳實　玄參　川芎　附子各一兩

加姜棗水煎服十劑如有痰再加薄荷一兩　右

藥分兩均作十劑

丸方二

羌活　防風　黃連　柴胡　獨活　全蝎去頭足用土炒

白芷各一兩　當歸　谷精　地骨皮各二兩　白茯苓

芍藥　熟地　茯神　遠志各一兩五錢　乳香　沒藥

檀香各六錢　細辛七錢　姜蚕八錢　射香三錢　甘菊三兩

棗子肉半斤　風藤二兩

右為末蜜丸或黃米飯丸如桐子大飛硃砂為衣

每服三錢用前煎藥送下日服三次

肝風　先傳脾經外證發紫皰

煎方三

防風半斤　玄參　當歸　牛膝　柴胡　芍藥

蟬殼各一兩　胡麻　草烏各四兩　白芷　官桂各一兩五錢

有痠加乾葛二兩　右藥均作十劑服

丸方四

防風　荆芥　葛根　丢子四兩　胡麻　當歸

草烏　玄參　麻黃　附子各一兩　蒺藜　乾姜

皂角　桔梗　牛膝　川芎　羌活　甘草各二兩

全蝎一兩五錢 苦參五兩 右爲末蜜丸桐子大青黛爲衣

脾風 先傳腎經外證遍身頑痲或時刺痛

煎方五

防風 當歸 風藤各二兩 玄參 川芎 甘草節

枳實 陳皮 白芷 桔梗 枳殼 烏藥各一兩五錢

木香一兩 有痰加半夏一兩五錢均作十服

丸方大

玄參 枳實 當歸 陳皮 白芷 胡麻 乾姜

厚朴 滑石各二兩 防風半斤 川芎 甘草 姜蚕

芍藥 麻黄 草烏 蟬殼 羌活 全蝎 木香各一兩 右爲末蜜丸用鬱金黄柏末爲衣

肺風 先傳肝經外證眉鬚鬓髮焦脱

煎方七

玄參 川芎 知母 滑石 半夏 蒺藜 牙皂 黄芩 牛膝 胡麻 羌活 乾姜 桔梗 木香 當歸各二兩 有痰加防風三兩右均作十帖

丸方八

當歸 牛膝 防風 蟬殼 獨活各四兩 羌活

胡麻 石膏 首烏各三兩 荊芥六兩 姜蚕 全蝎

南星 白芷各二兩 玄参五兩

右爲末、蜜丸、滑石、半夏末爲衣、

臍風 先傳心經外證脚底穿爛、

煎方九

甘草 麻黄 防風 羌活 薄荷 茯苓 桔梗各一兩 川芎 當歸 厚朴 半夏 知母 黄柏各二兩 獨活 大黄 苦参各四兩 滑石五兩 有痰加石膏三兩、均作十貼服、

丸方十

桔梗 川芎 白朮 丟子各四兩 當歸 甘草

厚朴 木香 乾葛各一兩 牛膝半斤 人參 乾姜

白芷 全蝎 麻黃各二兩 天麻一兩五錢 白花蛇五錢

右爲末蜜丸用百草霜爲衣

胃風 遍傳五臟外證渾身潰爛

煎方十一

羌活 澤蘭 藿香各二兩 蒺藜 柴胡 防風

細辛 白芷 薄荷各三兩 荆芥四兩 獨活 木瓜

牛膝 連翹 黄芩 生地 山查各二兩五錢 菖蒲

枳實 陳皮各一兩 麻黄一兩五錢 有痰加貝母、石膏、各

一兩均十劑、

丸方十二

荆芥二兩 蒺藜 天麻 白芨各一兩五錢 獨活 柴胡

羌活 木瓜各三兩 三風藤 皂莢 厚朴 前胡

貝母 蒼耳子 金銀花各一兩五錢 射香二錢 乳香

檀香各三錢 紫背浮萍四兩

右爲末、蜜丸、甘草、大黄末爲衣、

通經利竅湯　此藥三十貼按日服之但風濕

初服藥起須以此開經絡

第一日十三

大黃　荊芥　桔梗　歸尾　黄芩各一錢　羌活

防風　連翹各一錢二分　防巳　白芷各八分　牛膝七分

甘草五分

第二日

大黃　羌活　防風　桔梗各一錢　白芷　防巳

歸尾　獨活　荊芥　牛膝各八分　甘草五分

第三四日

羌活　桔梗　防風　黃芩各一錢　白芷　荊芥

防已　獨活　牛膝　歸尾各八分　甘草五分　腹中有積作痛加製大黃一錢、心痛大腸不利則用生大黃一錢

第五六七八日

羌活　獨活　防風　荊芥各一錢　歸尾　芍藥

防已　連翹　黃芩各八分　甘草五分　如腹痛大便不利加大黃一錢

第九日

大黃 荆芥 羌活 獨活 防風 川芎各一錢
當歸 牛膝 黃芩 白芷 桔梗 甘草各八分
十日至十八日同惟大黃用二錢

十九日

大黃 黃柏 連翹 羌活 苦參 荆芥 黃芩各一錢 黃連 防風 防已 甘草 當歸各八分 第二十日如有白蟲從大便出藥與十九日同如無再加白丑末虛弱者不加

二十一二日

黄柏炒 大黄煨 苦参 羌活各一錢 連翹 防風

黄芩 牛膝 防巳 獨活各八分 甘草五分 黄連一錢五分

二十三四日

芍藥 羌活 黄芩 荆芥 牛膝 白芷 大黄

連翹各一錢 獨活 當歸 防巳 桔梗各八分 甘艸五分

二十五日

苦参 連翹 獨活 當歸 防巳 桔梗 牛膝

芍藥各八分 防風 大黄各一錢 黄連七分 首烏一錢

川芎 甘草各五分

二十六七日同上

二十八日

首烏　芍藥　羌活　荆芥　防已各一錢　川芎

當歸　桔梗　牛膝　白芷　苦參　防風各八分

甘草五分

二十九三十日同服此倘痕色不退再服此方

三四劑　右藥三十貼俱水煎早晚服溫酒過

口如腸澁加大黄一錢

白玉蟾遺方內治痺麻諸風癧瘓爛攣腫危併

大麻、雞爪、鄲曳、螻蟈、冷麻等症、

防風　黃連　黃柏　苦參　牛膝　草烏　麻黃

紫風藤　荊芥穗　蔓荊子　升麻　川芎　大黃

當歸　藁本　山梔　右水煎服大劑十服、內毀俱

通其外油光紫黑疙瘩皆退、隨服丸方、

白玉蟾丸方　十五

川胡麻　川牛膝　木瓜　山梔　黃柏　蒼术

明天麻　白蒺藜各五兩　五加皮　風藤　羌活

苦參　當歸各十兩　水銀　水花硃　車米麪包煨

射香三錢 香蛇一兩 代赭石二兩醋煆 新鮮壬子肉四十兩此即大風子肉

先將大風子肉用水二十碗煮至二三碗濾干入臼搗爛以硃汞豬米四味共研不見星收磁器內用香燭花果供于八仙元壇神前忌婦女雞犬觸汚再將各藥末稱準以煮大風子汁加陳米糊丸如桐子大於卯午酉時各服三錢酒送下病輕者只服二錢或一錢五分至四五日反覺病凶口內齒根麻木精神恍忽過後漸痊面色紅活再不沉重惟要戒守則永不發

白玉蟾末藥方十六 治癱瘓、軟痿、冷麻、困痺、大有奇功、

草烏 白朮 硃砂 細辛 雄黃 白芷 防風 蒼朮各五兩 麻黃半斤 川烏一大個 右爲末、每服一錢、用葱白頭七枚、陳酒一碗、煎滚送下、重者用二錢、先以藥湯洗、再進此藥、臨臥服、取汗避風、

白玉蟾浴湯方十七 將各藥燒湯洗滌、如燗者日洗一二次、

蒼耳子 防風 荆芥 馬鞭子艸 紫蘇 苦參

金銀花　白芷　遍地香　澤蘭

白玉蟾蒸法　十八

先以湯藥洗滌再用蒼朮一觔煎酒五六碗將地鋪稻柴再用蒸薦鋪糠四五斗米醋十餘杓拌勻蒸熱鋪在薦上用麻蓋糠令人睡之上以棉被蓋之待出臭汗毒氣已盡漸去衣被須于無風處蒸之

白玉蟾擦藥方　十九

白芷　草烏　南星　半夏　丟子　杏仁　白芨
白蘞　蛇床各等分　右為末手足及遍身有瘋塊成

瘡或冷麻者以生姜蘸藥擦之待皮活病退方止當先用洗法次服末藥次又行汗法隨時擦之隔三日再洗再汗再擦一連五六次如病不減不得已方行蒸法劫之但丸方要服數年

大瓢李遺丸方 二十 治截蚝蛇皮刺風風痒風雞爪疙瘩歷節等風併麻木冷痛手足屈折痛痒不知痿癓癰瘓腐爛危篤等症

琥珀五錢 天麻一錢 眞珠 冰片 硃砂 胆星 血竭 姜蚕各二錢 蟬退 細辛各四錢 川芎 羌活

防風各六錢 遠志五錢 茯神八錢 犀角三錢五分 菖蒲六錢五分

鐵粉三錢六分 雄黃 牛黃各四錢六分 蛇寒石醋煅四錢六分

白附子五錢二分 半夏四錢四分 射香 蘆薈 烏梢蛇各五錢五分

牙皂一兩 玉子霜半斤 青礞石煅四兩

右為末、酒糊丸桐子大、每服一百丸、空心酒送下、如覺恍忽困倦麻木委厥者、以莃薟蒼耳金銀藤煉膏服之、

大瓢李末藥方二十二 治男婦癘風癱瘓、口眼歪邪、面如蟲行、身痛如切、或皮肉淫癢難忍、久

而手足反張

當歸　防風　川芎　白芷　細辛　麻黃　荊芥

全蝎　天麻　藁本　雄黃　羌活　甘草各五錢

硃砂　人參　白花蛇　大茴香　兩頭尖各三錢

香蛇七錢　川烏　草烏　蒼术各四兩

右爲末每服五六分漸至一錢臨臥以無灰酒調服忌一切熱物或有汗麻木身癢乃藥力至也服此後用鳳仙花梗煎湯洗浴汗出爲度

人參固本丸　二十二　治手足攣痛晝靜夜劇歷節

大風腰腿痛口眼喎邪

白术四兩　没藥　沉香各五錢　天麻　青皮　人參

白芷各一兩　蒼耳子二兩　烏藥三兩　紫蘇一兩五錢　甘艸五錢

右爲末酒糊丸梧子大每服百丸用後方煎藥送下

煎方二十三

白术　桂心　防風　人參　柴胡　甘草　川烏

當歸　防已　芍藥　赤茯苓　姜棗煎服

孫思邈眞人煎方二十四　治核桃紫雲等風

防風 苦參 薄荷 芍藥 黄芩 連翹 山梔
知母 柴胡 大黄 麻黄 天麻 半夏 花粉
甘草 紫蘇 香附 白芷 當歸 羌活 加細
茶一撮煎服五六貼退斑十服效臨臥服忌見風

孫思邈眞人丸方 二十五

牙皂 苦參 蒺藜 防風 當歸 荆芥穗
蔓荆子 牛蒡子 胡麻各一兩 黄柏三兩 白花蛇
丢子各四兩 射香二錢
右爲末黄米飯丸桐子大硃砂爲衣每服四十丸

日服三次清茶送下忌食鹽物止食淡鴨妙

邋遢張眞人靈寳千年大藥 二十六 治三十六種

大風後人稱平分家產方

羌活 蒼朮 烏藥 風藤 防已 白芷 防風

大黄 五加皮 獨活 藁本 桔梗 草烏

柴胡 黄芩 明天麻 細辛 甘松 蔓荊子

白蒺藜 川續斷 芍藥 南星 大腹皮

皂角刺 薄荷 各三兩 槐角 荊芥 升麻 各五兩

紫萍 鬧羊花 各二斤 麻黄 十斤 天雄 一箇 當歸 半斤

苦參皮二斤　紅花　玄參各六兩　仙靈脾　萆薢各三兩

草烏頭四兩　用陰陽水各一桶春浸五日夏三秋

七冬九煎去渣煉成膏

人參　白朮　沉香　川芎　木香　乳香　牛膝

紅花　磁石醋煅七次　沒藥　香蛇　血竭　松脂

姜蚕　檀香　安息香　雲母粉　梣香　鵞管石

蓯蓉各一兩　茯苓　雄黃　砂仁　青礞石　萎蕤

胡麻各二兩　蟾酥　射香各五錢　冰片二錢　花蛇一條

人牙炙黃香五兩

右爲末以前膏和丸彈子大硃砂爲衣金箔包畏遠年病服十丸近年病五七丸用麻姑酒磨服汗出則病愈　方中若加桑螵蛸原蠶蛾末各一兩五錢尤妙

神效奪命還眞丹　二十七　治三十六種風如癱麻痺曳大麻啞風癘風立效

全蝎　姜蠶　黄芩　陳皮　熟地　肉桂　生地
蔓荆子　地骨皮　黄連　甘菊　防風　茴香
芍藥　知母　枳殼　柴胡　甘草　石膏　當歸

半夏各一兩　明天麻　木香　川芎　槀本　兔絲子
白朮　人參　獨活各一兩五錢　羌活三兩　桔梗　麻黃
薄荷各二兩五錢　細辛五錢　蛤蚧一對酥炙　茯苓二兩
右為末蜜丸彈子大金箔為衣每服一丸細嚼
中風癱瘓大風癘病茶酒下　遍身筋骨痛及心
氣痛不省人事熱醋湯下　頭風暗風茶下　驚
癇口吐涎溫酒下　婦人胎前產後經水不調香
附湯下　冷風寒濕氣頓抽掣走注叫號日夜不
安黑豆炒焦煮酒下　又有一方加射香牛黃冰

片更妙、

東華玉髓 二十八 尹蓬頭眞人傳以丢子油爲君

丢子生東夷島故以此名、

大風子依法取油四兩 沒藥 滴乳 血竭各二錢 牛黃一錢五分

射香五分 阿膠一錢 琥珀 珍珠各三錢 雄黃五錢

地龍火炙去土七錢 冰片三錢 芒硝八分

右研末隔湯化油藥攪勻每服一錢內熱者秫餅湯下內寒者花椒湯下平常者溫酒下其大風紫黑委痺癱瘓攣屈喎邪臭爛危篤者不過一料全

愈須絕慾戒性避風忌一切腥鮮鹽物五辛諸毒只宜食淡方能見效〔紫雲風〕去牛黃芒硝加血竭一錢乳沒各四分〔雲顏成形不退腫起〕以艾作小炷四圍團團炙每炙五七團泄其氣即愈〔蛇皮風魚鱗風〕加白花蛇末一錢冰片二分有細瘡乘癘同治〔漏蹄白癜風〕加牛黃三分〔臭〕加水飛雄黃末三分五厘〔冷麻風〕加羌獨活歸尾各五分〔瘦弱者去芒硝〕加人參五分地骨皮柴胡各一錢〔內熱者〕加川芎白芍黃芩山梔各一

錢歸尾一錢五分

〔癩瘡〕用枯礬四兩、硫黃人言煆各一錢、花椒三兩、生礬五錢、蛇床二兩、共爲末、用猪油調敷

〔手腿大爛不收斂〕用黃占一兩、東丹五錢、膩粉二錢、乳香沒藥東米各三錢、桐油調油紙攤貼、

〔爛瘡〕用爐甘石五錢、龍骨三錢、乳香沒藥雄黃各五錢研細乾摻

〔風癬〕用蛇床子雄黃、砒等分爲末醋調青布包之重重頻擦

〔癢塊〕用車米、硫黃各一錢大風子一兩、樟冰雄黃各二錢、爲末以生芝麻二

合炒黑研和如泥以生布包擦塊上四五日愈爛者不用其破者皆屬脾經毒已從破處出內服追毒則自愈

起泡者用相蛤粉車米石膏乳没等分研末敷之

眉落者用荆芥防風白芷蟬殼天麻首烏羌獨活各五錢去子肉四兩牛旁子大黃各六錢

眼赤加菊花五錢

兩眼痛去大風子二兩加全蝎七錢蜜丸桐子大臨臥以方中止去大風子將各藥剉劑煎之送下五七十丸

生眉用牙皂炒加麝香少許雞蛋油調生絹包擦眉稜上

二十日可出、

黑斑用皂角、鹿角、菜白附子、等分爲末姜汁調、惟塗久脫、常州吳氏亦以此方得名、每活四兩、用乳沒六分、血竭二錢、芒硝八分、牛黃三分服之、雖效、總不如前方有奇功　如夏暑油不肯凍、不能成膏、以米仁炒熟研末加入爲丸服

餘時以藥放酒盞內、每日在飯上炖化服以助胃氣、服至十日、其毒必追至手足處、發出或腫或瘡、卽將草麻子、江子去子、打成膏貼之、其臭水淌出滋延、敗惡不可聞、以菖蒲草根炒末掺上卽乾

癬如臭水流盡則愈急服補氣血藥三年方保全生

神效追風丸二十九 治癩麻疙瘩熱風乾風一切危篤等症

當歸 麻黃 羌活 白朮各伍錢 荊芥二兩 白芍 黃芩 姜蚕 川芎各一兩 人參三錢 蒺藜 胡麻 防風各二兩 乳香 没藥各二錢五分 射香四分 苦參皮六兩 大風子肉四兩 右爲末黃米粉酒糊丸梧子大每服五七十丸早晚温酒下

搜風四七丹 三十 治紫雲白癜紫癜等風

防風 川芎 當歸 芍藥 麻黃各五錢 黃芩

山梔 連翹 白朮 甘草 薄荷 桔梗 全蝎

蟬殼 羌活 獨活 胡麻 乾葛 升麻各六錢

荊芥一兩 人参三錢五分 牛膝 滑石各一兩 木香七分五厘

射香五分 石膏八錢 大風子肉半斤

右爲末黃米粉糊丸桐子大每服五十丸空心酒

下茶亦可

神仙換骨丹 三十一 治鼓槌軟癱風乾癘癆麻委

困倦敗等症、

大黃　白芷　槐花　川芎　防已各一兩　乳香

沒藥　木香　沉香各三錢　蒼朮二兩　細辛　苦參各一兩五錢　紫萍三兩　射香五分　草烏五錢炒、三錢生、三錢炒黑、共一兩一錢、

右爲末、用去節麻黃半斤、煎膏、加蜜丸彈子大、約重二錢、硃砂爲衣、每服一丸、臨臥葱酒磨服、避風、

又一方、去蒼朮、加當歸、防風、花蛇、

大消風散三十二　治雞爪癢風、脫跟、魚鱗、鵝掌、鰦鰦、截蛀、癮風等症、

防風 蒺藜 荆芥 苦參各十二兩 乳香 沒藥各二兩

射香五錢 當歸 黃柏各半斤 黃芩 胡麻各十兩

丢子肉一斤煮一晝夜

先以一料去丢子沒射乳均作十貼煎服再用一全料不見火爲末酒米糊丸桐子大辰午戌時各服三錢溫酒下 如面上病重加白芷風粉蟬殼各四兩升麻五錢 口眼喎邪加白姜蚕四兩 四肢重加羌獨活各四兩 如服此藥須用細辛蒼耳草莃薟草遍地香馬鞭子草煎湯不時洗浴

待汗透神爽方止久則脫愈

救苦回生丹 三十三 治歷節半肢、紫雲、啞風、蠱風、

乾風、走注、遍身寒濕、麻痺、癱瘓等症、及中風

不語、口眼喎邪、

乳香 沒藥 當歸 川芎 各一兩五錢 五靈脂 木香

松香 自然銅 醋煆 威靈仙 各一兩 虎骨 炙 地龍 草烏

各五錢 天麻 七錢 全蝎 射香 各三錢 荊芥 白芷

苦參 各一兩二錢 番木別 炙 三十箇 氷片 三分 京墨 一塊

黑豆 炒二合 鬧羊花 五錢 姜蚕 六錢

右爲末糯米飯丸如龍眼大硃砂爲衣金箔飛裹薄荷酒磨下一丸如昏迷則病愈若婦人血暈經閉胎衣不下用炒焦黑豆淋酒服之如神

班龍八帥丹 三十四 治螻蟈蝦蟆癱腫等症

姜蠶炒 花蛇炙 香蛇炙 蜈蚣炙 蜂房炙 川山甲炙

全蝎炙 蟬殼 鹿角煅

右各等分爲末每服三四分酒下或以此藥加在各方丸散中服之無不立效

奇效良丹 三十五 治脛水漏蹄冷風壁泥蛇皮一

切大風服之皆效

胡麻　木瓜　山梔　黄芩　牛膝　蒼朮　沃麻
五加皮　蒼耳子　風藤　羌活　獨活　細辛
黄柏　蒺藜各五兩　苦參　當歸各十兩　麻黄　紫萎蕤
防己　姜蚕　草烏各三兩　甘松　蟬殼　紫萍各四兩
乳香　没藥　香蛇各二錢　代赭　磁石各二兩醋煆
荆芥八兩　川芎一兩五錢　毛子十二兩　射香一錢五分
右爲末蜜丸桐子大硃砂爲衣每服五十丸酒下
一粒金丹三十六　又名赤龍丸又名一錠金治遍

身韓曳魚鱗刺風遠年寒濕手足痠痛走注叫喚者

射香二錢五分 乳香六錢 沒藥 當歸各七錢 地龍
白膠香各二兩五 木別子五錢 草烏 五靈脂各二兩
京墨 線膠麪炒 紫萍各二兩五錢

右爲末用去節麻黃二兩煎汁煮大米飯丸龍眼大硃砂爲衣每服一丸酒下至黑汁從足底出乃爲驗日進二服

搜風順氣丸三十七 治軟癱風邪魅風熱風蟲風

併腰腿腹痛氣悶、冷熱寒濕脚膝少力男婦怯弱、此能和三焦、潤五臟厚腸胃中風者服之大有功、

製大黄　麻仁　山萸　山藥　梹榔　兎絲子

枳殻　防風各三兩　牛膝二兩　郁李仁　獨活各一兩

車前子二兩五錢

右爲末、蜜丸桐子大每服百丸、或酒或茶下、壯精神、消百病、癱瘓腸風並效、

保眞丸三八　治大麻、邪魅、半肢、軟癱等風麻痿

痠疼不能動止者

人參　川芎　草烏　川烏　白芷　當歸　槐角

五加皮　羌活　獨活　紫背浮萍　防風　荆芥

首烏　枳殼　連翹　風藤　烏藥　杜仲　桔梗

肉桂　乾姜　姜蚕　石楠藤　甘草　芍藥

升麻　虎骨　花蛇　防巳各一兩五錢　乳香　没藥

沉香各五錢　麻黄二十斤去節

右爲末，用麻黄煎膏丸，每丸重五錢，酒磨服一丸，

神效，避風爲妙。

二八濟陽丹三十九　治軟癱、瘋麻、血風、癧風、乾風、冷麻、半肢血痺、鵞掌風、血枯氣敗等症

玄參半斤酒漿浸晒三次　苦參一斤姜汁酒漿各浸一夜晒炒末半斤　犀角

當歸　蒺藜　熟地　白芷姜汁炒　獨枝防風

全蝎去足土炒　牛旁子　乳香　沒藥　石楠藤　紅花

各二兩　甘草五錢　姜蠶炒去絲足嘴一兩五錢

此藥前二味各八兩、後十四味二十八兩、共十六味故名二八丹共爲末蜜丸桐子大、每服四十丸、陳酒下、日進三次、

六神輔聖丸四十治疙瘩雁來冷風癢風麻痺

痛風

草烏一斤白嫩者佳 麻油一斤 甘草半斤 荊芥 羌活

紫蘇 風藤各四兩

用無灰酒煮一晝夜另用一鍋煎滾汁浸之方可擠去烏皮如用冷酒浸則烏皮擠不脫矣將草烏擠淨搗爛爲丸每服二十丸溫酒下

四魔丹四十一治癱曳顛風蟲風癱瘓委頓者神效

敗龜板（煅）　白番木別（麻油煮三沉三浮）　鬧羊花（酒拌九蒸晒各二兩）

蒼耳子（炒）一斤　白蜜一斤

右爲末煉蜜和均入竹筒內掛當風處七日後初次服五分三四日服六分漸加至一錢空心燒酒下

火龍散（四十三）治脫跟蛇皮魚鱗漏蹄核桃癱爛麻木委敗等症神效

人牙（一兩五錢）　雄黃　辰砂　大黃（酒蒸）　代赭石（醋煅各一兩）

共爲末每服三錢臨臥用防風荊芥煎湯洗浴熱

酒送下即睡則皮內毒蟲追出肌膚然後用雄黄、硫黄硃砂代赭石車米各等分研末香油調重擦遍身撓愈

東靈丹 四十三 治核桃壁泥截蚝白癜鼓槌等風

丢子一斤半 防風 荆芥 牛旁子 苦参 首烏
風藤各三兩 桔梗 枳殼 川烏 草烏 香附
大黄 黄芩 木賊草 白附子 角刺 兩頭尖
白芷 檳榔 烏藥 石膏 薄荷 滑石 山梔
芒硝 葶藶 木通 木香 没藥 胡黄連

車前子　黃柏各一兩　甘草　蒺藜　羌活　天麻
白朮　柴胡　葛蒲　藿香　蔓荊子　天花粉
姜蚕　厚朴　陳皮　藁本　威靈仙　遠志
麻黃　枸杞　甘菊　蟬殼　血竭　乳香各二兩
胡麻四兩　梧桐皮淚　黃連　花蕋石　辛夷
射香　青皮各五錢　牛黃一錢　氷片五分
右為末棗肉丸菉豆大每服五七十丸春白湯夏
茶秋鹽湯冬酒下忌油膩生冷

小棗丹四十四　治鵞掌風刺風癜風

防風　姜蠶　首烏　全蝎　羌活　獨活　芍藥
威靈仙　生地　蔓荆子　牛旁子　苦参　胡麻
大黄　黄芩各二兩　枸杞子　薄荷　南星　天麻各二兩
荆芥　柏枝　山梔各四兩　炙甘草五錢　白术一斤
壬子肉一斤　兩頭尖一錢要大者爲生
右爲末棗肉丸桐子大每服六十丸薄荷湯下
守中丸四十五　治雁來鼓槌核桃紫雲水風此係
山西張守中所用故名之
防風　荆芥　苦参　連翘各二兩　當歸　胡麻

牙皂　蔓荊子　蒺藜　牛蒡子各三兩　白芷　甘草
硃砂各五錢　羌活　獨活各一兩五錢　陳皮　黃芩
胡黃連　山梔　升麻　天麻各一兩　乳香　沒藥
牛黃一錢　射香三分　冰片三分

右爲末、米糊丸、毎服三錢、鹽湯下、

祖傳玉樞丹四十六　治白癜螻蟈癧風

苦參皮　荊芥穗　當歸　元参　蒼朮各八兩　烏藥
羌活　川胡麻　藁本　白芷　防風　白蒺藜
川芎　獨活　麻黃　蒼耳子　甘草各四兩　紅花

牛蒡子　天麻　姜蚕　風藤　薄荷各三兩　草烏

半夏　貝母　桔梗　大黃　萎蕤各一兩　射香一二錢

牛黃一錢　木香　檀香　沉香　乳香　沒藥

血竭各一兩五錢　琉璃灰二兩者方加　爛桑螵蛸一兩　銀柴胡各二兩

不見火蚕蛻　玄明粉　秋石　蘇木　夏枯草　虎骨

旱蓮草　犀角各二兩　仙靈脾一兩五錢　大風子肉四兩

右爲末陳米糊丸桐子大硃砂爲衣用後煎藥送

下百丸早晚服如怕服煎藥以酒代之在密室中

睡三四時方可行動

煎藥方四十七　水煎送前丸藥

黄芩　大黄　羌活　獨活　防風　防已　連翹

黄柏　桔梗　荆芥　當歸　山梔　木通　白芷

甘草　半夏　紫蘇　薄荷　升麻　麻黄　川芎

烏藥

補舊湯四十八　又名救苦湯　治飲餼壁泥血痺

血風

苦參皮一錢五分　牛旁子　人參　首烏　山梔各一錢

姜蚕　白蘚皮　防風　連翹　天麻　蔓荆子

黄芩各五分　全蝎　黄連　甘草各四分　薄荷　羌活
獨活　荊芥各三分　乾葛　黄柏各七分　威靈仙　蒺藜各八分　仙靈脾怯弱者加五分
先用酒煎十貼服再用水煎須儘量飲酒服至百貼其眉鬚復生腫塊漸退手足瘓頓者有力須戒色省勞避風忌口方能有功再以每味加十倍為末再加乳香沒藥血竭沉香各一兩氷片牛黄各一錢射香二錢用米仁糊丸桐子大硃砂為衣每服百丸酒下三年身固絶根臨服時每服加威靈

仙末三分效速

神釀丸 四十九 治歷節痛風筋骨走痛

蒼朮 八兩 草烏 三兩 杏仁 川芎 白芷 半夏 各二兩

右剉片用姜二斤葱一斤搗汁拌濕以藥鋪入瓶內封好埋土中春三夏五秋七冬九日取出晒乾加猴姜木香牛膝紅花各二兩當歸萆薢茄根各四兩共爲末老酒糊丸桐子大每服六十丸酒下日進三次神效 又一方有乳香沒藥射香地龍各五錢尤奇

神守散　五十　治蛇皮、魚鱗、邪魅、痰風、癲風、一切危急之症

番木別。用銅刀刮去粗皮。將麻油入瓦礶內煎滚。漸投下木別煎之。待三沉三浮。發泡焦黄。取出晒乾爲末。每服一分。臨臥白湯下。避風。待汗乾方可起。服至百日。眉生。指直。斑退。瘇消。瘡斂。如病熱反增。乃内毒發出。甚妙。此方亦治痰火。服之則痰從兩脇滚下。又治顛癎。量人强弱服。一方藥末一兩。加甘草末五錢更妙。如藥力凶。以黑豆湯解之。菉豆湯亦可。

雄漆丸 五十一

嚴漆一兩 蟹黃五錢 拌勻晒。漸去面上汗水待盡。又加水飛雄黃、牙皂末各五錢。爲丸不可見日晒則不乾。每服三分。溫酒下。

參翎丸 五十二

陽年純白鷰一隻、男用雄。女用雌。撏其毛不可失一根。炒爲末。用苦參皮一斤。酒煮爲末。黃米酒糊丸桐子大。每服百丸。空心酒下。服完病愈。

吳氏苦參丸 五十三 此方胡僧傳於東塘吳氏。今

以養生一料共三十六觔治三十六種風病
不知其由
苦參十斤 草胡麻九斤 防風 荊芥 蒺藜各五斤
丟子二斤 俱生用爲末酒水爲丸每服一二合日
進三次似覺傷人臟腑姑集之以備參攷能治漏
蹄螻蟈餓餻脫跟疙瘩等風惟黑色瘦爛併初起
年少者服之方好若久病血衰氣弱老年俱不宜服

調榮丸五十四 治大麻瘋麻韡曳啞風顛風諸癩
川芎 蘇木 丹皮 蒲黃 乳香 沒藥 草烏

血竭　烏藥　菖蒲　黃芩各一兩　益母草　生地
敗龜板　夏枯草　熟地　枸杞　當歸各四兩
阿膠　苦參　茯苓各二兩　知母　地骨皮　人參各一兩五錢　瑣陽五錢　牛膝　銀柴胡　藁本　升麻各三兩
桃仁　芍藥　柴胡　紅花各一兩二錢　右為末蜜丸
桐子大。卯年酉時各服百丸乳酪湯下。

大定風丸　五十五　治痛風麻痺寒濕走注疼痛

南星　白芍　木瓜　官桂　甘草　荆芥　川烏
姜蚕　白芷　牛膝　當歸　梹榔　天麻　人參

首烏各一兩五錢 羌活 桔梗 獨活 白朮 防已

全蝎 木香 半夏 厚朴 杜仲 黃芩各二兩

陳皮 枳實 麻黃各三兩 白附子 防風各二兩五錢

蒼朮一斤 川烏一兩 乳香 沒藥 沉香 血竭各五錢

右爲末酒糊丸桐子大每服七十丸酒下

駐車丸五十六 治歷節痛痺寒濕脚氣抽掣

獨活 川烏 沙參 生地 蒺藜 白芷 木瓜

海桐皮各五錢 米仁 羌活 防風 細辛 甘草節

牛膝各一兩 右爲末用五加皮浸酒煎汁爲糊丸桐子

大每服七十丸酒下

如意通聖散五十七又名麻黃赤芍湯治白虎歴節痛風寒濕手足不能舉渾身走注抽掣叫號等症

罌粟殼　丁皮香　麻黃　赤芍　防風　荆芥　當歸　川芎　羌活　獨活　白芷　甘草　黃芩　威靈仙　草烏黄炒色　桔梗　葛根各二錢五分　入乳香沒藥末各三分煎熱服蓋被取汗如病在眉背上加白芷末二錢如用乳沒芷末待煎好冲服

八將軀邪散 五十八 即八將追魂丹 又名三厘

散 治大風癱爛敗症

射香 三分 川山甲 炙一兩 蜈蚣 炙去頭足三錢 土狗 炙 地龍 去土炙

番木別 酥炙 金鼎砒 雄黃 各五錢

右爲末每服三厘。溫酒下。服七日。停七日。服退藥一月。又服之。如人素弱。只服三日。就服退藥五日服補藥三日。再服之。不然使人牙齒浮爛唇潰破敗。飲食不進。幾于無救矣

退藥 五十九

乳香 沒藥 血竭 硃砂 當歸 元參 胡麻 桑寄生 牛黃 沉香 各等分爲末蜜丸服

補藥 六十

桑螵蛸 晚蠶蛾 銀柴胡 仙靈脾 牛膝 防巳 紅花 破故紙 柏子仁 天冬

右爲末蜜丸梧子大每服五十丸酒下日進二次

陽起聖靈丹 六十一 治痛風不舉伏床者

當歸 枳殼 川芎 各四錢 虎骨 酥炙 牛膝 木爪

生地 桑寄生 補骨脂 天花粉 烏藥 麻黃

頭皮　山藥　蒼朮　自然銅各二錢　赤芍　姜蚕

白芷　桔梗　黄芩　紅花　黄芪　甘草

陽起石　龍泉香各三錢　防風　荊芥　連翹

風藤各一兩

右爲末用不見水鵞掌二隻酒煮焙乾又用狗蹄四隻燒灰用鵞血煮酒各半碗不見水狗血一碗加麪少許爲丸桐子大用葱酒送下七八十丸早晚服一月全愈

鉄庵丹　六十三　治諸般風症

大風子一斤用麻黃閙羊花各四兩酒煮一晝夜 苦参皮酒拌九蒸晒一斤
荆芥穗淨末一斤 白蒺藜微炒一斤 狗虱胡麻微炒淨末一斤
〔春〕加柴胡 升麻 川芎 藁本各四兩 〔夏〕加桔梗
黄芩 半夏 銀柴胡各四兩 〔秋〕加石膏 甘草
元参 當歸各四兩 〔冬〕加知母 生地 五加皮
地骨皮各四兩 〔心經〕加茯苓 硃砂 遠志
山萸 蒲黄 當歸各四兩 〔肝經〕加荆芥 白芷
風藤 羌活 白芍 甘草 地黄各四兩 〔脾經〕加
荆芥 白朮 陳皮 蒼朮 獨活 乳香 沒藥

血竭各四兩 肺經加天麻 桔梗 半夏 貝母
柴胡 沙參 巴戟 胡麻各四兩 胃經加黃栢
知母 茯苓 當歸 升麻 草烏 甘草各四兩
胃經加枳殼 藿香 蒼朮 半夏 厚朴 柴胡
益智 草果 白豆蔻各四兩
右爲末。酒糊丸桐子大。每服百丸。溫酒下。日進三次。

保命丹 六十三

苦參皮 荆芥穗 羌活 蒺藜 胡麻 明天麻
風藤 元參 獨活 連翹 白芷 厚朴 紫萍

牛膝各四兩 蒼朮 烏藥 藁本 麻黃 甘草
紅花 蒼耳子 川芎 升麻 薄荷 半夏
牛蒡子 木瓜 姜蚕 桔梗 大黃 蒲黃
巴戟 防風 萆薢 蟬殼 牙皂 全蝎 續斷
蔓荆子各二兩 石斛二兩 甘松 猴姜 菖蒲 草烏
貝母 木香 檀香 沉香 銀柴胡 柏子仁
硃砂 浮香 沒藥 遠志 元明粉 血竭
雄黃各一兩 射香一錢五分 牛黃一錢 秋石一兩五錢 茵芽二兩
手足攣痛加萎蕤半斤 香蛇一條 陽痿加仙靈脾六兩

身浮腫加白花蛇一條 紫萍八兩 黑斑加麝香零陵香

地骨皮 血見愁各四兩 眼赤爛加珍粉 知母

胡黃連各四兩 破音加木通十二兩 訶子六兩

右為末用甘草膏和陳米糊丸桐子大每服八十

丸酒下日進三次

搜風無價丸六十四 治諸癩風

全蝎四兩 苦參三兩五錢 防風 當歸 川芎各三兩 蟬殼

荊芥 羌活各二兩五錢 柴胡 獨活 牙皂各二兩

丟子十兩

右不見火爲末早赤米糊丸桐子大土硃爲衣每服五十丸茶酒俱可下

八仙丹 六十五 治新久一切大風

巨勝子 麻黃 苦參 荆芥 防風 獨活 各十二兩 大風子肉 八兩 蒺藜 四兩

右晒爲末赤米糊丸桐子大土硃爲衣每服七十丸茶下

射老丸 六十六 治癩風變形敗體一切惡症

蟬殼 當歸 柴胡 荆芥 各二兩五錢 苦參 三兩五錢

防風三兩 全蝎四兩 川芎二兩五錢 獨活一兩六錢 羌活二兩

右晒爲末每藥末一兩加大風子肉一兩六錢爲末赤米糊丸梧子大西洋珠爲衣每服八十丸白湯下日進三次三日後其腿下黑紫堤上汚皮漸好十日後卽服利藥一次每月利三次

利藥方 六十七

江霜一錢 牙皂末三錢 飯丸菉子大每服二丸白湯下

小還丹 六十八 治癩風眼爛昏花眉髮脫落鼻梁崩倒肌膚瘡癬穢破臭惡癱爛勢危不救者

可用。

皂角制三斤酒拌濕大火蒸半日取出晒乾　白鵞毛一隻微火炒　苦参酒浸一日夜打取皮半斤

右爲末。用大黃煎酒打糊丸桐子大。每服三十丸

酒下。服至旬日。眉髮生肌膚潤。眼目明。一料全愈。

六和定風散九十六　治癱瘓風寒濕痺歷節白虎等

風。

蒼术四兩　草烏二兩　杏仁一兩一錢去尖皮　當歸　牛膝各四錢

乳香　没藥各一錢

以生姜。胡葱。搗自然汁各一碗。浸蒼术。待蒼术浸

白晒乾。又加去節麻黃末一兩。每服三四分。酒下。

重者五六分。其病根從元府汗中泄盡愈。

轆轤丹 七十 治大風惡癩手足筋攣屈曲癱瘓者

細辛　川芎　黃芪　防風　金毛狗脊　菖蒲

獨活　丹皮　牛膝　米仁 各一兩　山藥　蒼耳實

當歸　巴戟　秦艽 各一兩五錢　藁本　漏蘆　牛蒡

天麻　虎骨 各二兩　蒺藜 三兩

右為末。酒糊丸桐子大。每服五十丸。酒下。以粗藥

末加柴胡煎湯浴

長春丸七十一治風癩困頓者

苦參　獨活　荆芥　蒺藜　紫萍　蒼朮

風藤各六兩　木通三兩　草烏二兩　大風子一斤

巨勝子十二兩　仙靈脾四兩　俱不見火

右爲末水滴丸每服五十丸茶下

固命丹七十二又名飛步丹治風癩既愈之後氣

血虧敗過服尅伐藥未免神枯陽痿憔悴昏

倦腰脚痠軟四肢不暢服此可使如舊無病

人五十以外者若常服延齡却病行步如飛

妙難盡述

人參　熟地各四兩　枸杞　麥冬冬六兩　白茯苓

當歸各一斤　仙靈脾取葉一斤去毛酒拌蒸

右爲末蜜丸桐子大每服四十丸米湯酒俱可下

如陽痿不起加眞陽起石原蚕蛾各四兩甚妙

五子芥風丸七十三　治大風症

胡麻子　蒺藜子　車前子　澄茄子　大風子

荊芥　防風各二兩

右爲末酒糊丸桐子大。每服百丸。或茶或酒下。

順氣散七十四 治風癘之人元氣拂滯鬱悶不寧。常服之清爽。

陳皮 桔梗 白芷 甘草 枳殼 川芎各二兩
姜蚕 麻黃 乾姜 烏藥各一兩

右爲末每服三錢。姜棗湯下。

二九還元丹七十五 治風癘危篤惡症。

胡麻 苦參 荆芥各半斤 防風 升麻 羌活
獨活各二兩 風藤 木通 黃柏 當歸 白芷各四兩

柴胡三兩 姜蚕一兩五錢 蟬殼 川芎各一兩 蒺藜二兩五錢

大風子十二兩

右為末酒糊丸桐子大。硃砂射香為衣。每服五十丸。溫酒下。日進三次。避風戒色。

二聖散七十六 治癘風瘡爛。

大粉草 大柴胡 各等分為末。每服三錢。或酒或湯下。日進三次。服至百日自然病愈。

戒止丸七十七 治穢爛黑腫臭惡癘風。

荊芥 白芷 防風各十二兩 苦參一斤去子八兩

白蒺藜　胡麻　牛蒡子各十兩　當歸　紅花
川芎各四兩　鬧羊花四兩酒蒸晒二次
右爲末酒糊丸桐子大每服百丸早晚茶下腹中
響動不安兩三時即定
參靈丸七十八　治大風腫爛癱瘓抽掣齒頰大有
奇功
苦參一兩　荊芥　防風　牛膝　威靈仙各四兩　蒺藜
胡麻各一兩　丟子八兩　鬧羊花五錢
右爲末黄米糊丸桐子大每服六十丸白湯下日

進三次

烏龍丸 七十九 治癧風遍身瘡癬瘍疥腫爛臭惡、服此消風散熱利膈化痰又治肺氣不和能推陳致新去腸垢滌臟腑穢毒大有功

肥皂角刮去皮筋子水浸搥爛絞去渣取汁入瓦器煎膏用黑丑末共搗為丸桐子大每服五十丸白湯下如氣虛者服二三十丸無病之人氣若實服一兩利用三五次不傷正氣身體輕健肌膚光澤永無風淡疥癬

洞虛丹 八十 治惡風麻木走注抽痛者

藁本 天麻 川芎 細辛各一兩五錢 牛膝 羌活各三兩

大風子四兩 蟬殼 胡麻 防風 獨活 姜蚕

荆芥 蘇木 風藤 石膏 蒺藜 山梔 芍藥

菖蒲 石蚕 黃芩 連翹 草烏 紫萍 升麻

紅花 麻黃 白芷 石斛 當歸 威靈仙各二兩

右為末，酒糊丸桐子大，每服百丸，用羊躑躅草根一觔四兩，打碎，以酒二十觔煮，去渣，每以一盃送下。一月病愈。忌食鹽物

清平丸 八十一 治大風中風跌撲打傷喎癖等症

有歌爲證

天生靈草無根幹　不在山間不在岸

始因飛絮逐風飄　泛梗青青浮水面

神仙一味去沉痾　採時須是七月半

癱麻疼痛立時消　寒熱瘡痍及癱瘓

任從癱瘓暴中風　些小微風都不算

黑淋酒化服三丸　鐵幞頭上也出汗

七月上旬採河中紫背浮萍曬乾爲末䗯勅加草烏

萎蕤 風藤 麻黃各二兩 射香二錢
共爲末蜜丸彈子大以草烏煎酒磨服一丸 重
者以烏頭煎酒磨下輕者以黑豆炒香烹酒磨服

豨薟丸 八十二 治肝腎風氣四肢麻痺骨節痠疼
腰膝無力癩風瘻爛濕痰中風口眼喎邪手
足屈曲癱瘓等症
於五月五六月六七月七等日採豨薟草葉拭去毛
沙土曝乾以老酒拌蜜酒層層和洒以柳木甑蒸透
晒乾共九次加乳香沒藥沉檀降木真射等香當歸

血竭各等分共爲末蜜丸桐子大毎服三錢無灰酒下神効

胡麻丸 八十三 治大風大癘中風乃風科之妙方

胡麻一斤 苦參皮五斤酒浸七日 荊芥穗四斤 蒂薟草葉淨三斤 蒼耳草葉淨三斤 紫背浮萍二斤蒸透晒乾 先將蒂薟蒼二味蜜拌蒸一伏時晒乾後共爲末酒糊丸桐子大硃砂爲衣毎服百丸茶酒俱可下日進三次

獨聖散 八十四 治鼓槌風手指攣瘸足趾腫爛脫落腿肘曲折腫痛難忍

蓖麻子肉二兩碎者不用　黃連二兩　同貯瓶內加水浸之春五夏三秋七冬九日取出每晨朝東南方以瓶中水一鍾吞蓖麻一粒漸加至四五粒若微泄無妨如手指足趾節間腫疼諸病即愈戒食動風辛辣毒物

跨鶴丹八十五　治雞爪風

五加皮　海桐皮　川烏　川芎　赤芍各五錢

乾姜　肉桂各一錢

右為末每服三錢用水二盞將青錢一個入清油浸三日同煎服

靈芽益珠 八十六 治爛風瘡頓臭惡疼痛

人蝨以水養淨再以凝茶養三日夜炙香爲末每兩加射香一錢酒糊丸彈子大每服一丸熱酒磨下臨臥周時自醒病若脫去重者五七丸全愈

雄漆丸 八十七 治爛風瘡穢臭惡者

透明雄黃水飛淨 八兩 淮熟地 八兩 乾漆灰 一兩

右爲末醋糊丸桐子大每服七十丸酒下服藥一料全愈

蓬萊東 八十八 治癱瘓瘡爛臭惡困頓者

北紅棗一斤取肥大不破者五壹草取自然汁十碗一名猫兒眼又名漾灌草

透骨草即馬鞭草 左纏藤即金銀花 夏枯草 透天龍即茜草

土風藤即九龍草 蒲公英各取汁一碗 黃花根一兩

右各草於二月中旬收採加白酒漿二碗入砂鍋內文火慢煎汁盡用千年葉川椒煎湯洗去棗上泥陰乾如病人手指彎痾屈倒五年者服二觔十年者服四觔二十年者不治服時要在靜處避風端坐養神先吃一個三日外增三枚五日外增五枚常服之仍以扁柏川椒湯洗手外用沉香射香

末爲衣更妙。其煮過棗汁。爲瘡疸圍藥極好。或以金銀花條蒸晒爲末和丸。外科服之甚妙。風科服之亦好。

聖散子 八十九 治諸風瘻困攣曲臭惡危爛者。

鬧羊花根 老酒拌缸岸郎坑要多年露天者九蒸晒 人牙 黄炙醋煅三四次各一兩

雄黄 水飛各八錢 牛黄 一錢二分 蟾酥 三錢 硃砂 五錢 射香 一錢

右爲末。每服四分。沙糖調濕酒下。

花龍丸 九十 又名混元丹 治風濕腰背以下腿股癱瘓寸步不能日夜抽掣伏床不起。

蒼朮四兩　黃柏酒浸炒　靈毅酥炙　牛膝　當歸　萆薢　防巳　茄根皮各一兩

右爲末。酒糊丸桐子大。每服百丸。姜鹽湯下。

白龍丸九十一　又名捕龍丹。治風濕腰跨以上肩背大痛。肘髆殭軟。匙筋難舉。傴僂脊高。

乳香　沒藥　川烏　草烏　地龍　南星各等分

右爲末。酒糊丸。每服四十丸。或酒或荊芥湯下。服至四兩。除根。外以石楠葉煎湯洗沃。

香身丸九十二　治大風腥臭。穢人不能近者

白芷　香附　當歸　桂心　檳榔　益智
甘松各三兩　檀香二兩　射香　韶腦各五錢　木香
沉香　松子各二兩五錢　香蛇二兩
右爲末甘草膏丸桐子大臨臥含化五丸大能祛症。
大衍丸九十三　治諸風癱瘓變形脹腫困敗者
羌活　當歸　白芷　防風　粉草　連翹　熟地
牛蒡子　姜蚕各二兩　蒺藜六兩　玄参半斤酒拌晒
苦參皮一斤酒浸九蒸晒　右爲末酒糊丸桐子大每服百
丸滾湯下日進三次外用　甘草　黄栢　荆芥

苦參　槐頭　椿頭　防風　大風子殼　葱煎湯洗浴、

仙花膏九十四　治大風惡症神效。

鬧羊花八兩酒蒸九次　蒼耳子八兩炒　敗龜板煅白如霜二兩　番木別酥炙二兩

右爲末、用蜜一觔。熬去水氣、調之入竹筒內。掛當風處、病人初起酒服五分、弱者服一二分、不飲酒者、沙糖調下。

水製黃香丸九十五　又名黃龍丸、治諸風危困、無藥可治將斃者、

鍋上硫黄（黑色者曰雌黄色者曰雄）各半打碎溶化傾入釅醋内取出碾面牛油取淨者一觔用竹筒一箇削去青入硫在内以蠟封口投入無水糞坑中浸一年取起放長流水中四十九日　明亮松香溶化加燒酒煮六七沸傾入冷水内抽扯去内若黄味再煮再抽一連七次扳淨細白無脚方用三兩　茅朮（米泔浸刮去粗皮用白淨者）一斤　紫檀香　茅香（俱不見火）　白膠香　川烏（炮去皮）　川芎（各四兩）　惡實（頭末）　草烏（炮去皮）　明天麻（各三兩）　一方加地龍二兩各

黄龍丸

右為末陳米糊丸梧子大每服五十丸滚

湯下。如皮膚發熱。加番木别五錢。以麻油煮熟。忌猪肉房事。

治鵝掌風鴈來風方九十六

銀杏肉打爛。搓擦如乾。摸去查。不可水洗。再加冰片射香各三分研勻。桐油調塗上。以艾火薰之。

又方

用真平胃散。桐油調塗。于炭火上薰之。頻塗頻薰。

又方

用烏骨白雞。勿使犯雌。另畜一處。收其糞。曬乾加入

蛇床子末煎湯入瓶內薰之待溫即洗　一方加雄黃皮硝尤妙

又方

用蒼术　艾　煎湯瓶內薰之候溫洗之

又方

水銀三錢鉛二錢化開投入水銀爲末用硫黄三錢研細將茄蒂蘸擦　一法以滴滷洗二三次則愈

白癜風方九十七

用麻油半觔生柿枕兩箇打爛和勻入鍋內熬黑去

渣嶊在患處自變好肉

三分散九十八　治諸惡風瘡困癱爛危篤者

鬧羊花酒拌九蒸晒　用生漆每兩加樟冰二錢雄黃二錢攪勻隔湯炖化拌蒸晒乾又以茜草根搗汁拌蒸晒乾爲末每兩加雄黃三錢麝香五分蟾酥二錢研勻每服三分沙糖調溫酒下半日不可見風

四物湯九十九

川芎　當歸　白芍　大生地

人參敗毒散一百

人參 羌活 獨活 前胡 柴胡 荊芥 防風

桔梗 川芎 枳殼 茯苓 生甘草 生薑

大棗

補中益氣湯 一百零一

升麻 柴胡 人參 綿黃芪 當歸 茯苓

白朮 炙草 薑棗

解圍元藪卷三終